



HIBRIDACIÓN

Isabelita del Japón x Donacola pecho castaño

Lonchura doméstica x Lonchura castaneothorax

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CABEZA:

-De color general marrón oscuro. Desde la frente, píleo y hasta la nuca podrán aparecer unas marcaciones más claras. La región auricular podrá presentar ligeras marcaciones más claras.

-Pico cónico, ancho en su base, de color plumizo presentando la mandíbula superior un color más oscuro.

CUERPO Y ALAS:

-De color general marrón oscuro. -Pecho castaño intenso y uniforme. La línea marrón oscura (en forma de "U") que separa el pecho del abdomen debe ser visible. Desde el abdomen, vientre hasta el bajo vientre el color es crema presentando marcaciones oscuras acentuadas en los flancos y en disminución hacia el bajo vientre. -El calzón oscuro, casi negro, debe ser apreciable.



COLA:

-Marrón castaño ligeramente puntiaguda (plumas centrales de mayor tamaño que las externas).
-Obispillo castaño oscuro con ligero velo rojizo. Subcaudales marrón oscuro o casi negro.

TALLA: 12 cm. (intermedia a la de sus progenitores).

ANILLA: 2.3~2.4 mm. de calibre aproximadamente.

Observaciones: Al Donacola pecho castaño también se le llama "Donacola común o Donacola" y la Isabelita del Japón también es llamada "*Lonchura striata domestica*" o "*Munia domestica*". Dependiendo de la mutación que presenten los progenitores el ejemplar híbrido podrá presentar aquellos colores o una tonalidad más clara, oscura, etc. No presentan dimorfismo sexual.

Murcia 13 de mayo de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA